DPC

Les réponses multiples au questionnaire sont cochées et en jaunes.
Plusieurs réponses sont possibles.

Journée SOP du 18 juin 2015 « *Prescrire juste : mode d'emploi* »

Question n°1 : *Réponse : a*

La codéine et le tramadol sont :

- **a. des morphiniques faibles** ☑
- b. des morphiniques forts ❑
- c. des non morphiniques ❑

Question n°2 : *Réponse : c*

En cas de douleurs faibles que prescrire ?

- a. du paracétamol dosé à 500 mg ❑
- b. des A.I.N.S. ❑
- **c. du paracétamol dosé à 1 g** ☑

Question n°3 : *Réponses : a + b + c*

Le paracétamol n'est pas contre- indiqué :

- **a. chez la femme enceinte** ☑
- **b. chez un patient sous A.V.K.** ☑
- **c. chez un patient sous antiagrégant plaquettaire** ☑

Question n°4 : *Réponses : b + c*

L'indication d'une antibiothérapie est recommandée :

- a. en cas d'alvéolite sèche ❑
- **b. en cas de stomatites bactériennes** ☑
- **c. en cas de sinusite odontogéne bactérienne** ☑

Question n°5 : *Réponses : a + b*

L'indication d'une antibiothérapie est recommandée :

- **a. en cas d'avulsion d'une dent de sagesse mandibulaire** ☑
- **b. en chirurgie pré-implantaire** ☑
- c. en chirurgie parodontale (poches mucogingivales) ❑

Question n°6 : *Réponses : b + c*

Dans les cardiopathies à haut risque (groupe A) certains gestes sont contre-indiqués ?

- a. l'anesthésie régionale ❑
- **b. les amputations radiculaires** ☑
- **c. la chirurgie pré-implantaire** ☑

Question n°7 : *Réponses : b + c*

L'antibiothérapie curative en 1ére intention est une :

a. antibiothérapie documentée (documentation bactériologique) ❑
b. monothérapie ☑
c. antibiothérapie probabiliste ☑

Question n°8 : *Réponse : a*

L'association colchicine (Colchimax®) et josacine (Josamycine®) est :

a. contre-indiquée ☑
b. recommandée ❑

Question n°9 : *Réponse : a*

L'association d'un A.V.K. et du Bactrim® entraine :

a. une potentialisation de l'A.V.K. ☑
b. ne modifie pas l'action de l'A.V.K. ❑

Question n°10 : *Réponse : b*

Dans le cas de patient atteint de cancer ou de polyarthrite rhumatoïde,
la prise en association du méthotréxate et de l'amoxicilline est :

a. contre-indiquée ❑
b. déconseillée ☑

Question n°11 : *Réponse : a*

Chez l'immunodéprimé, l'association d'une ciclosporine (Néoral® par ex) et de clarithromycine (Zeclar®) est :

a. déconseillée ☑
b. contre-indiquée ❑

Question n°12 : *Réponses : a + d*

Les A.I.N.S. ont une activité antalgique :

a. supérieure au paracétamol ☑
b. inférieure au paracétamol ❑
c. égale au paracétamol ❑
d. égale à l'association tramadol + paracétamol ☑

Question n°13 : *Réponses : a + b*

L'association paracétamol et A.I.N.S. a une activité antalgique :

a. supérieure aux 2 molécules prises séparément ☑
b. sera prescrite le plus souvent en 2ième intention ☑